Acrux 32,87EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Difenoconazole	250 g/l (25%)
Pyraclostrobin	78.7 g/l (7.87%)

Nombre Químico

Difenoconazole: cistrans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Pyraclostrobin: Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy)carbamate

No. CAS

Difenoconazole	119446-68-3
Pyraclostrobin	175013-18-0

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillo
Densidad:	1.0374 g/cm^3
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

Acrux 32,87EC es un fungicida con acción protectante y curativa. Absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal. Inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.Actúa como inhibdor de la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con equipo manual de espalda, motorizado o con equipo terrestre acoplado al tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
CAFÉ ***Coffea* spp.**	Roya ***Hemileia vastatrix***	0.5-0.75 L/Ha
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Alternaria ***Alternaria solani***	0.25-0.3 L/200 L agua
CEBOLLA ***Allium cepa***	Alternaria ***Alternaria sp***	0.20-0.3 L/200 L agua
CHILE (Pimiento) ***Capsicum annuum***	Oidium ***Leveillula taurica***	0.20L/200 agua
MAÍZ ***Zea mays***	Mancha de asfalto ***Phyllachora maydis***	0.20-0.25 L/200 L agua
ARROZ ***Oryza sativa***	Añublo de la vaina ***Rhizotocnia solani***	0.4 L/ha primeros síntomas. 0.5 L/ha presencia enfermedad

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Acrux 32,87EC

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

!
ATENCIÓN

PRESENTACIONES

100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml,
1 l, 4 l,10 l, 20 l, 200 l

REGISTRO

Panamá: 8060

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER