ARRASADOR 75,7 SG

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Glifosato sal de amonio 757 g/kg (75.7%)

Nombre Químico
Glifosato N-(phosphonomethyl)glycine

No. CAS
1071-83-6

FORMULACIÓN
Gránulos solubles (DG)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido.
Color: Blanco a amarillo claro.
Olor: Sin olor.
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

MODO DE ACCIÓN

ARRASADOR 75,7SG es un herbicida sistémico no selectivo para el control de gramíneas y hojas anchas, que penetra a través de la cutícula de las hojas u otros tejidos verdes. Absorbido por el follaje con rápida translocación en toda la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

ARRASADOR 75,7 SG Aplicar vía terrestre, ya sea con bombas de espalda o mochila, así como aplicaciones con tractor. Para aplicaciones con aspersores de espalda, se recomienda un volumen de agua de entre 50 y 200 litros por Ha, utilizando boquillas de baja descarga como las TJ 800050, TJ 8001, TK 0.5 y TK 1. Para aplicaciones con tractor se recomiendan boquillas de mayor descarga, como TJ 8002, TJ 8003, TK 1 y TK 2 o equivalentes, con el fin de evitar taponamientos.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a usar acorde a la superficie que pretende proteger. Poner en el tanque de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **ARRASADOR 75,7SG** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregar el resto de agua. Evitar aplicar sobre malezas recién cortadas, pastoreadas o con polvo sobe el follaje.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plagas a controlar	Dosis	Epoca de aplicación
MAÍZ ***Zea mays*** PALMA ***Elaeis guineensis*** CAFÉ ***Coffea spp.*** CÍTRICOS ***Citrus spp.*** AGUACATE ***Persea americana*** BANANO ***Musa spp.*** FRIJOL ***Phaseolus spp*** . MACADAMIA ***Macadamia ternifolia*** SORGO ***Sorghum vulgare*** MELÓN ***Cucumis melo***	Alambrillo ***Digitaria sanguinalis*** Arrocillo ***Echinochloa colonum*** Arroz rojo ***Oryza sativa*** Barba de indio ***Fimbristylis annua*** Bledo ***Amaranthus sp.*** Canutillo, siempre viva ***Commelina diffusa*** Churristate ***Ipomea spp.*** Coyolillo ***Cyperus spp.*** Cynodon ***Cynodon dactylon*** Escoba blanca ***Sida rhombifolia*** Gamalote ***Paspalum fasciculatum*** Glondrina erecta ***Euphorbia hirta*** Paja mona, Plumilla ***Leptochloa filiformis*** Pasto kikuyo ***Pennisetum clandestinum*** Pata de gallina ***Eleusine indica*** Pela bolsillo ***Rottboellia exaltata*** Verdolaga ***Portulaca oleracea*** Zacate guinea ***Panicum maximun***	0.5-1.0 kg/200-400 L de agua	Las aplicaciones deben realizarse durante la época de lluvias, sobre el follaje de las malezas que se encuentran creciendo vigorosas.
PIÑA ***Ananas comosus***	Malezas poáceas ***Rottboellia cochinchinensis*** ***Echinochloa spp.*** ***Digitaria sanguinalis*** ***Paspalum fasciculatum*** ***Panicum maximun*** ***Eleusine indica*** Dicotiledóneas ***Amaranthus sp.*** ***Portulaca oleracea***	1.5-2.0 kg/ha	Aplicación post emergencia a la maleza cuando tenga 2 a 3 hojas verdaderas o 30 días después de la siembra de piña. Usar 1500 L de agua/ha.

DIRECCIÓN:
Del cruce Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23. Costa Rica.

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

ARRASADOR
75,7 SG

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 g - 500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg.

REGISTRO

Panamá : 6270

FORMULADOR:
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTD.
Xinanjiang, Jiande City
Zhejiang Province, China

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23. Costa Rica.

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER