KEMPRO 25 SE

PINGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Carbendazim 125 g/L
Propiconazole 125 g/L

Nombre Químico
Carbendazim:
methyl 1H-bezimidazol-2-ylcarbamate (IUPAC)

Propiconazole:
(+/-)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-y]methyly]-1H- 1,2,4-triazole (IUPAC).

No. CAS
Carbendazim: 10605-21-7
Propiconazole: 60207-90-1

FORMULACIÓN

Suspo emulsión(SE)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanco a Beige
Olor: Sin olor
Densidad: 1.065 g/mL
pH: 6.0 - 9.0
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y almacenamiento.
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

KEMPRO 25 SE es un fungicida formado por dos ingredientes activos. Carbendazim y Propiconazole que actúan por acción sistémica, protectante y curativa con translocación acropetal por el xilema.

MECANISMO DE ACCIÓN

Carbendazim uno de los ingredientes activos, es un fungicida que inhibe la división nuclear y migración, desorganiza la estructura de las células del hongo y bloque procesos celulares. Por otro lado, el Propiconazole es un inhibidor de la síntesis de ergosterol.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretenda proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua que se vaya a emplear, adicionar la cantidad de **KEMPRO 25 SE** de acuerdo a la dosis recomendada y proceda a agitar. Adicione el resto de agua. Utilizar equipo de protección durante la manipulación y aplicación.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIÓN
HORTALIZAS	Roya ***Hemileia sp.***	0.8 - 1 L/ha	Cada 8 días dependiendo de la presión de la enfermedad.
MAÍZ ***Zea mays***	Rhynchosporium ***Rhynchosporium cercospora***	0.8 – 1 L/ha	Aplique al observar los primeros síntomas.
PIÑA ***Ananas comosus***	Fusarium spp. ***Oxysporum bayud***	2 – 3 L/ha	
ARROZ ***Oryza sativa***	Pyricularia ***Pyricularia oryzae***	0.8 – 1 L/ha	

INTERVALO DE APLICACIÓN

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo, indebido o fuera de las recomendaciones de la etiqueta por parte del consumidor.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA

Arroz: 35 días
Hortalizas: 30 días
Maíz: 45 días

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

KEMPRO 25 SE

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas de campo. Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

AVISO AL CONSUMIDOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: CATEGORÍA 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

1 L, 4 L, 5 L;20 L

N° REGISTRO

Panamá: **6269**

FORMULADOR

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD.
11 Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing – China.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC CUSTER S.A.
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste Oficentro Milano
Bodega 23 – Alajuela

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación